



**Los pacientes que se autodiagnosticaron su INR se mantuvieron en el rango terapéutico durante más tiempo que los pacientes que se autodiagnosticaron en un laboratorio o clínica.<sup>1</sup>**

1. Beyth RJ, et al. "Una intervención de varios componentes para prevenir las complicaciones hemorrágicas importantes en los pacientes de edad avanzada que toman warfarina". *Arch Intern Med*. 2000;160:687-695.  
2. Budnits, et al. "Hospitalizaciones de emergencia a causa de efectos adversos de los fármacos en estadounidenses de edad avanzada". *New England Journal of Medicine*. 2011;365:2002-12.  
3. Heneghan C, et al. *Lancet* 2006; 367:404-11.  
4. Heneghan C, et al. "Autocontrol de la anticoagulación oral: una revisión sistemática y un metanálisis". *Lancet*, 2006; 367:404-11.  
COAG-SENSE® es una marca registrada de CoagSense, Inc.  
COAGUCHEK es una marca registrada de Roche Diagnostics.

©2021 MD-10-04-SP (02/21) 06076



**Control total del paciente que toma warfarina**

## OUTSIDE


### Beneficios clínicos del autocontrol

- Ayuda a mantener a los pacientes en el rango terapéutico, lo que puede reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el medicamento y las visitas a la sala de emergencias.
- Una reducción de las complicaciones relacionadas con los medicamentos puede tener un impacto positivo en los gastos de atención médica de la anticoagulación.
- Reducción demostrada de la aparición de accidentes cerebrovasculares y eventos hemorrágicos.
- Proporciona una alerta oportuna a los médicos cuando los pacientes se encuentran fuera de rango.
- La mejora de la administración de fármacos antitrombóticos, sobre todo warfarina, puede reducir las hospitalizaciones a causa de efectos adversos de los fármacos en los adultos mayores.<sup>2</sup>

### Efectos probados del autodiagnóstico semanal

- Los pacientes de edad avanzada permanecen más tiempo en el rango terapéutico con las pruebas semanales.
- Las personas que se someten a pruebas semanales presentan un número significativamente menor de valores críticos.
- Las personas que se someten a pruebas semanales son menos propensas a quedar significativamente fuera del rango terapéutico.
- Los pacientes de 75 años o más están en el rango terapéutico con más frecuencia con el autocontrol semanal que con la asistencia tradicional en una clínica de anticoagulación.

El autocontrol semanal puede mejorar los resultados de los pacientes<sup>3</sup>



**Menor riesgo: un análisis de estudios sobre el autocontrol del paciente (PST) reveló que los pacientes capaces de autocontrolar su terapia con warfarina podrían beneficiarse de una reducción de un tercio de las muertes por todas las causas.<sup>4</sup>**



## INSIDE